

Administration par sonde entérale ou lors de problèmes de déglutition : recommandations au CHS de la Sarthe en matière d'écrasement des comprimés et d'ouverture des gélules.

REGLES GENERALES :

En l'absence de rainure sur un comprimé, la division est aléatoire et devrait être évitée. Il est préférable d'utiliser un autre dosage, une autre forme ou spécialité.

Il ne faut pas couper , écraser , ouvrir les formes orales :

- Gastro-résistantes (sauf pour les sondes jéjunales)
- A libération modifiée (retard, LP, OROS, LM...), les gélules LP peuvent être ouvertes mais sans écraser leur contenu.
- Contenant des principes actifs instables à la lumière ou à l'air.
- A base de substances irritantes
- Contenant des principes actifs toxiques
- Contenant des substances à marge thérapeutique étroite (AVK, anticonvulsivant, digoxine)
- Contenant un excipient huileux (capsules)

EN PRATIQUE :

- s'assurer que le comprimé peut être écrasé ou la gélule ouverte.
- Mettre des gants et si besoin un masque
- Ecraser le comprimé le plus finement possible
- disperser la poudre obtenue avec 10-15 ml d'eau . Mettre ce mélange dans une seringue.
Dans le cas d'un comprimé dispersible bien remuer la solution pour enlever le gaz carbonique (risque de reflux).
- si besoin stopper la nutrition entérale
- rincer la tubulure
- administrer le médicament
- il est indispensable de bien rincer la sonde après le passage du médicament

L'**administration** doit se faire **extemporanément** : ne pas écraser les comprimés à l'avance car les principes peuvent être instables à l'air, à l'humidité ou à la lumière.

En cas d'administration de plusieurs médicaments :









- NE PAS écraser plusieurs comprimés en même temps
- Le mortier et le pilon devront être nettoyés entre chaque médicament
- Rincer la tubulure entre chaque médicament et à la fin



















écraser 




















ne pas écraser ni ouvrir **NON**












ouvrir 
















dissoudre ou déliter dans l'eau 


















| Spécialité | Recommandations | sonde entérale | remarque, explication | alternative | Réf. |
|---------------------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| ABILIFY 5 MG cp | NON | | | cp. orodispersible | 1 |
| ABILIFY 10 MG cp | NON | | | cp. orodispersible | 1 |
| ABILIFY 15 MG cp | NON | | | cp. orodispersible | 1 |
| ABILIFY orodispersible cp |  | Oui | | | 6 |
| ACTISKENAN 5 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 3,5,6 |
| ACTISKENAN 10 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 3,5,6 |
| ACTISKENAN 20 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 3,5,6 |
| ACTISKENAN 30 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 3,5,6 |
| ACTONEL 5 mg cp | NON | | | | 1,6 |
| ACTONEL 30 mg cp | NON | | | | 1,6 |
| ACTONEL 35 mg cp | NON | | | | 1,6 |
| ADALATE 10 mg capsule |  | | PA photosensible | | 2,3,4 |
| ADALATE LP 20 mg cp | NON | | | forme retard | 1,5,6 |
| ADANCOR 10 mg cp |  | Oui | ne pas dissoudre dans l'eau | | 3,5,6 |
| ADANCOR 20 mg cp |  | Oui | ne pas dissoudre dans l'eau | | 3,5,6 |
| AKINETON 4 mg LP | NON | | forme retard | | 1,5 |
















| | | | | |
|--------------------|---|-----|--|-------------|
| ALDACTAZINE cp |  | Oui | insoluble dans l'eau , mélanger dans l'eau ou les aliments | 2,4,5,6 |
| ALDACTONE 25 mg cp |  | Oui | insoluble dans l'eau , mélanger dans l'eau ou les aliments | 3,5,6 |
| ALDACTONE 50 mg cp |  | Oui | insoluble dans l'eau , mélanger dans l'eau ou les aliments | 5,6 |
| ALDACTONE 75 mg cp |  | Oui | insoluble dans l'eau , mélanger dans l'eau ou les aliments | 2,3,4,5,6 |
| ALDOMET 250 mg cp |  | Oui | adm. immédiate car PA sensible à l'oxydation | 2,3,6 |
| ALDOMET 500 mg cp |  | Oui | adm. immédiate car PA sensible à l'oxydation | 2,3 |
| ALEPSAL 15 mg cp |  | | très dur à écraser | 1,6,7 |
| ALEPSAL 50 mg cp |  | | très dur à écraser | 1,6,7 |
| ALEPSAL 100 mg cp |  | | très dur à écraser | 1,6,7 |
| ALEPSAL 150 mg cp |  | | très dur à écraser | 1,6,7 |
| ALKERAN | <u>NON</u> | | cytotoxique | 3,6 |
| ALPRESS LP 2,5 mg | <u>NON</u> | | forme retard | 1,2,3,4,5,6 |
| ALPRESS LP 5 mg | <u>NON</u> | | forme retard | 1,2,3,4,5,6 |
| AMAREL 1 mg cp |  | Oui | | 5,6 |
| AMAREL 2 mg cp |  | Oui | | 3,5,6 |
| AMAREL 3 mg cp |  | Oui | | 5,6 |
| AMAREL 4 mg cp |  | Oui | | 3,5,6 |
| AMLOR 5 mg gélule |  | Oui | | 2,3,4,5,6 |
| AMLOR 10 mg gélule |  | Oui | | 6,7 |
| ANAFRANIL 10 mg cp | <u>NON</u> | | | 5,6 |
| ANAFRANIL 25 mg cp | <u>NON</u> | | | 5,6 |
| ANAFRANIL 75 mg cp | <u>NON</u> | | forme retard | 3,5,6 |
| ANCOTIL 500mg cp |  | Oui | | 2,3,4,5 |
| ANDROCUR 50 mg cp |  | Oui | | 2,3,4,5,6 |


















| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----------------------------|----------------------|-----------|
| AOTAL 333 mg cp gastroR | NON | | | | 2,3,4,5,6 |
| APRANAX 550 mg cp | NON | | | forme sachet | 1,2,3,4,5 |
| APRANAX 750 mg cp LP | NON | | | forme sachet | 1,5,6 |
| APROVEL 150 mg cp |  | Oui | | | 3,7 |
| APROVEL 300 mg cp |  | Oui | | | 3,7 |
| ARICEPT 5 mg cp |  | Oui | goût amer | forme orodispersible | 3,6 |
| ARICEPT 10 mg cp |  | Oui | goût amer | forme orodispersible | 3,6 |
| ARTANE 2 mg cp | NON | | | sol. buvable | 3,5,6 |
| ARTANE 5 mg cp | NON | | | sol. buvable | 3,5,6 |
| ATACAND 4 mg cp |  | Oui | | | 5,6 |
| ATACAND 8 mg cp |  | Oui | | | 3,5,6 |
| ATACAND 16 mg cp |  | Oui | | | 5,6 |
| ATARAX 25 mg cp |  | Oui | goût désagréable | forme sirop | 2,4,5,6 |
| ATARAX 100 mg cp |  | Oui | goût désagréable | forme sirop | 2,4,5,6 |
| ATENOLOL 50 mg |  | Oui | | | 6,7 |
| ATENOLOL 100 mg |  | Oui | | | 6,7 |
| ATHIMYL 10 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| ATHIMYL 30 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| ATHIMYL 60 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| AVLOCARDYL 40 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| AVLOCARDYL LP 160 mg gél |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 5,6,7 |
| AZANTAC 150 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| AZANTAC 300 mg cp eff |  | Oui | | | 3,6 |
| BACLOFENE 10 mg cp |  | ND | | | 7 |















| | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|--------------------|-------------|
| BACTRIM forte 800mg/160mg cp | NON | | | susp. buvable | 3,4,5 |
| BELUSTINE 40 mg | NON | | cytotoxique | | 1,3,6 |
| BETAHISTINE 8 mg cp |  | Oui | | | 3,5,6 |
| BEVITINE 250 mg |  | Oui | goût désagréable | | 6 |
| BILTRICIDE 600 mg cp |  | Oui | se désagrège dans l'eau | | 2,3,5,6 |
| BI-PROFENID 150 mg cp | NON | | forme retard | | 1,5,6 |
| BIRODOGYL cp |  | Oui | | | 7 |
| BI TILDIEM LP 90 mg cp | NON | | | | 1,2,3,6 |
| BI TILDIEM LP 120 mg cp | NON | | | | 1,2,3,6 |
| BRICANYL LP 5 mg cp | NON | | | | 2,3,4,5,6 |
| BUSPAR 10 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| CARDENSIEL 1,25 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| CARDENSIEL 2,5 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| CASODEX 50 mg cp |  | ND | Ne pas faire manipuler par femme enceinte se protéger avec gants et masque adm. aussitôt après écrasement et mise en suspension | | 7 |
| CATAPRESSAN 0,15 mg cp | NON | | | | 2,3,4,5,6,7 |
| CELECTOL 200 mg cp |  | Oui | uniquement pour adm. par sonde = pas de contact avec muqueuse buccale. | SECTRAL* sol. buv. | 2,3,4,5,6 |
| CELIPROLOL 200 mg cp |  | Oui | uniquement pour adm. par sonde = pas de contact avec muqueuse buccale. | SECTRAL* sol. buv. | 6 |
| CELLCEPT 250 mg gélule | NON | | | | ,1,3,6 |
| CELLCEPT 500 mg cp | NON | | | | 1,3,6 |
| CELLTOP 25 mg capsule | NON | | | | 3,6 |
| CELLTOP 50 mg capsule | NON | | | | 3,6 |
| CELLTOP 100 mg capsule | NON | | | | 3,6 |
| CHIBRO PROSCAR 5 mg cp |  | Oui | ne pas faire manipuler par femme enceinte | | 2,3,6 |
















| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|--|-------------------------------------|-------------|
| CHRONADALATE LP 30 mg cp | NON | | forme retard | | 1,2,3,4,5,6 |
| CIFLOX 500 mg cp |  | Oui | | susp. buvable | 2,3,4,5,6 |
| CIFLOX 750 mg cp | NON | | | susp. buvable | |
| CIPRALAN 130 mg cp | NON | | | | 1,3,4,5 |
| CLAMOXYL 500 mg gélule |  | Oui | | | 2,3,4,5 |
| CLAMOXYL 1 g cp dispersible |  | Oui | | | 3 |
| CLARITYNE 10 mg cp |  | Oui | | cp effervescent | 3,5,6 |
| CLOPIXOL 10 mg cp | NON | | | sol. buvable mélangée avec de l'eau | 6 |
| CLOPIXOL 25 mg cp | NON | | | sol. buvable mélangée avec de l'eau | 6 |
| COLCHICINE 1 mg cp |  | Oui | | | 2,5 |
| COLCHIMAX 1 mg cp |  | Oui | | | 2,6 |
| COLIMYCINE 1,5 MUI cp |  | Oui | | | 1,2,3,4,5,6 |
| COLTRAMYL 4 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| COMBIVIR 300 mg / 500 mg cp | NON | | | | 3,5,6 |
| COMTAN 200 mg cp | NON | | | | 3,6 |
| CONTRAMAL gélule 50 mg | NON | | | sol.buvable | 1 |
| CONTRAMAL LP cp | NON | | forme retard | sol.buvable | 1,6 |
| CORDARONE 200 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| CORTANCYL 1 mg cp |  | Oui | préférer corticoïde soluble/ medrol,solupred | | 2,4,5,6 |
| CORTANCYL 5 mg cp |  | Oui | préférer corticoïde soluble/ medrol,solupred | | 2,4,5,6 |
| CORTANCYL 20 mg cp |  | Oui | préférer corticoïde soluble/ medrol,solupred | | 2,6 |
| CORTISONE 5 mg cp |  | Oui | préférer corticoïde soluble/ medrol,solupred | | 2,3,4,5,6 |
| CORVASAL 2 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| CORVASAL 4 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
















| | | | | | |
|---------------------------|---|-----|--|--------------------|-------------|
| COUMADINE cp |  | Oui | utiliser rapidement produit à marge thérapeutique étroite : attention à la dose | | 2,4,5,6 |
| COVERSYL 2 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| COVERSYL 4 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| COZAAR 50 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| CREON 12000U gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,5,6 |
| CREON 25000U gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 2,4,6 |
| CRIXIVAN 200 mg gélule |  | Oui | | | 3,5,6 |
| CRIXIVAN 400 mg gélule |  | Oui | | | 3,5,6 |
| CYMBALTA gélule | NON | | gélule gastro résistante | | 1,7 |
| CYNOMEL 25 µg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| CYTOTEC 200 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| DAFALGAN CODEINE cp | NON | | | efferalgan codeine | 2,6 |
| DAFLON 500 mg cp | NON | | adm. immédiate avec de l'eau ou un aliment | | 3,4,5,6 |
| DAKTARIN 125 mg cp |  | Oui | possibilité de mélanger avec du lait | | 2,3,4,5,6 |
| DALACINE 150 mg gélule |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| DANTRIUM 25 mg gélule |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| DANTRIUM 100 mg gélule |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| DAONIL faible 1,25 mg cp |  | Oui | prise avant le repas goût amer | | 2,3,4,5,6 |
| DAONIL 5 mg cp |  | Oui | prise avant le repas goût amer | | 2,3,4,5,6 |
| DEBRIDAT 100 mg cp | NON | | | susp. Buvable | 3,6 |
| DELURSAN 250 mg cp |  | Oui | avec confiture ou compote | | 2,3,6 |
| DEPAKINE 200 mg cp | NON | | forme gastro R | sol. buvable | 1,2,3,4,5,6 |
| DEPAKINE 500 mg cp | NON | | forme gastro R | sol. buvable | 1,2,3,4,5,6 |
| DEPAKINE Chrono 500 mg cp | NON | | forme retard | | 1,2,3,4,5,6 |



















| | | | | | |
|-----------------------|---|------------|---|---------------|-------------|
| DEPAKOTE 250 mg cp | <u>NON</u> | | forme gastro R | | 1,3,6 |
| DEPAKOTE 500 mg cp | <u>NON</u> | | forme gastro R | | 1,3,5,6 |
| DEPAMIDE 300 mg cp | <u>NON</u> | | forme gastro R | | 1,2,4,5,6 |
| DEPRENYL 5 mg cp |  | Oui | prise le matin | | 2,4,5,6 |
| DEROXAT 20 mg cp |  | Oui | | susp. buvable | 2,3,4,5,6 |
| DETENSIEL 10 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| DIAMICRON LM 30mg cp | <u>NON</u> | | | forme retard | 1 |
| DIAMICRON 80 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| DIAMOX 250 mg cp |  | Oui | avec aliment ou sirop de fruit pour cacher l'amertume | | 2,3,4,5,6 |
| DI ANTALVIC gélule |  | non | avec compote ou confiture | forme suppo | 2,3,4,5,6 |
| DICLOFENAC 50 mg cp | <u>NON</u> | | forme gastro R | | 3,6 |
| DICYNONE 250 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| DICYNONE 500 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| DIDRONEL 200 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5 |
| DIFFU K 600 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 2,3,4,5,6 |
| DIGOXINE 0,25 mg cp | <u>NON</u> | | | sol buvable | 2,3,4,5,6 |
| DI HYDAN 100 mg cp |  | Oui | | | 3,5 |
| DIPIPERON 40 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 1,2,3,4,5,6 |
| DISULONE 100 mg cp |  | Oui | avec confiture ou yaourt | | 4,5,6 |
| DITROPAN 5 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| DOGMATIL 50 mg gélule | <u>NON</u> | | | sol buvable | 2,3,6 |
| DOGMATIL 200 mg cp | <u>NON</u> | | | sol buvable | 2,5,6 |
| DOPERGINE 0,2 mg cp |  | Oui | adm. immédiate PA photosensible | | 2,4,5,6 |
| DOPERGINE 0,5 mg cp |  | Oui | | | 2,4,5,6 |


| | | | | | |
|---------------------------|---|-----|--------------------------------------|--------------|-----------|
| DOXYCYCLINE 100 mg cp |  | Oui | | | 3,7 |
| DUPHASTON 10 mg cp |  | Oui | adm. immédiate PA photosensible | | 2,3,4,5,6 |
| EBIXA 10 mg cp |  | Oui | ne pas mélanger avec du pamplémousse | sol. buvable | 6,7 |
| EFFEXOR 25 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3,6 |
| EFFEXOR 50 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3,6 |
| EFFEXOR LP 37,5 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 1 |
| ELISOR 20 mg cp |  | Oui | adm. immédiate | | 6,7 |
| ENTOCORT 3 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,5 |
| EPITOMAX 15 mg gélule |  | Oui | | | 1,5,6 |
| EPITOMAX 25 mg gélule |  | Oui | | | 1,5 |
| EPITOMAX 50 mg cp | <u>NON</u> | | | | 1,3 |
| EPITOMAX 100 mg cp | <u>NON</u> | | | | 1 |
| EPIVIR 150 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 3,5,6 |
| EQUANIL 250 mg cp |  | | PA peu soluble dans l'eau et amer | | 6,7 |
| EQUANIL 400 mg cp |  | | PA peu soluble dans l'eau et amer | | 6,7 |
| ESIDREX 25 mg cp |  | Oui | goût désagréable | | 2,3,4,5,6 |
| ESPERAL 500 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| EUPHYLLINE LP 50 mg |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 2,3,4,5,6 |
| EUPHYLLINE LP 100 mg |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 2,3,4,5,6 |
| EUPHYLLINE LP 200 mg |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 2,3,4,5,6 |
| EUPHYLLINE LP 300 mg |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 2,3,4,5,6 |
| EUPRESSYL 30 mg gélule |  | Oui | | | 3,5,6 |
| EUPRESSYL 60 mg gélule |  | Oui | | | 3 |
| EXELON 1,5 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 1,3,6 |












| | | | | | |
|---------------------------|---|-----|------------------|---------------|-----------|
| EXELON 3 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 1,3,6 |
| EXELON 4,5 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 1,3,6 |
| EXELON 6 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 1,6 |
| FANSIDAR 25 mg/ 500 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| FARLUTAL 500 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| FENOFIBRATE 100 mg gélule |  | Oui | | | 3,5,6 |
| FENOFIBRATE 300 mg gélule |  | Oui | | | 3,5,6 |
| FLAGYL 250 mg cp |  | Oui | goût désagréable | susp. buvable | 6,7 |
| FLAGYL 500 mg cp |  | Oui | goût désagréable | susp. buvable | 6,7 |
| FLECAINE 100 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| FLODIL LP 5 mg cp | <u>NON</u> | | | | 2,3,4,5,6 |
| FLOXYFRAL 50 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,6 |
| FLOXYFRAL 100 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| FLUDEX LP 1,5 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3,5,6 |
| FLUDROCORTISONE 10 µg |  | Oui | | | 3,4,5 |
| FLUDROCORTISONE 50 µg |  | Oui | | | 2,3,4,5 |
| FLUVERMAL 100 mg cp | <u>NON</u> | | | susp. buvable | 2,3,4,5,6 |
| FONZYLANE 150 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| FONZYLANE 300 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| FOSAMAX 10 et 70 mg cp | <u>NON</u> | | | | 1,6 |
| FUCIDINE 250 mg cp | <u>NON</u> | | | susp. buvable | 2,3,4,5 |
| FUMAFER 200 mg cp | <u>NON</u> | | | poudre orale | 3,4,5 |
| FUNGIZONE 250 mg gélule | <u>NON</u> | | | susp. buvable | 2,3,4,5 |
| GARDENAL 10 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
















| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|--|---------------|-------------|
| GARDENAL 50 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| GARDENAL 100 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,6 |
| GLIBENESE 5 mg cp |  | Oui | | | 3,5,6 |
| GLUCOPHAGE 500 mg cp | <u>NON</u> | | | | 1 |
| GLUCOPHAGE 850 mg cp | <u>NON</u> | | | | 1,2,3,4,5,6 |
| GLUCOPHAGE 1000 mg cp | <u>NON</u> | | | | 1,6 |
| GLUCOR 50 mg |  | Oui | | | 3,5 |
| GLUCOR 100 mg |  | Oui | | | 3,5,6 |
| GRISEFULINE 250 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4 |
| GUTRON 2,5 mg cp |  | Oui | adm. Immédiate/ PA photosensible | | 2,3,4,5 |
| GYNERGENE CAFEINE cp | <u>NON</u> | | | forme suppo | 2,3,4,5,6 |
| HALDOL 1 mg cp | <u>NON</u> | | PA photosensible | sol. buvable | 2,4,5,6 |
| HALDOL 5 mg cp | <u>NON</u> | | PA photosensible | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| HAVLANE cp |  | ND | | | 7 |
| HEPT A MYL cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 6 |
| HYDREA 500 mg gélule |  | Oui | port de gant et masque | | 3,5,6 |
| HYDROCORTISONE 10 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| HYPERIUM 1 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| HYPOSTAMINE 100 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| IMODIUM 2 mg gélule | <u>NON</u> | | | susp. buvable | 2,3,6 |
| IMOVANE 7,5 mg cp |  | Oui | PA photosensible | | 2,3,4,5,6 |
| IMUREL 50 mg cp |  | Oui | cytotoxique: manipuler comme un anti-cancéreux | | 2,3,4,5,6 |
| INDOCID 25 mg gélule | <u>NON</u> | | | forme suppo | 2,3,4,5,6 |
| INEXIUM cp |  | Oui | | | 1,6 |


















| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------|-----------|
| INVIRASE 200 mg gélule |  | Oui | | | 3,5,6 |
| ISOPTINE 40 mg cp |  | Oui | | | 2,4,6 |
| ISOPTINE 120 mg gélule |  | Oui | | | 2,4,6 |
| ISOPTINE LP 240 mg cp | <u>NON</u> | | | | 1,6 |
| IXEL 25 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| IXEL 50 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| IZILOX 400 mg cp | <u>NON</u> | | PA photosensible | | 1,6 |
| JOSIR LP 0,4 mg |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 1,6 |
| KALEORID 1000 mg cp LP | <u>NON</u> | | | Diffu K | 2,3,6 |
| KALETRA 133,3mg/33,3mg cap | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 3,5,6 |
| KEPPRA 500 mg cp |  | Oui | goût amer | sol. buvable | 7 |
| KEPPRA 1000 mg cp |  | Oui | goût amer | sol. buvable | 7 |
| KERLONE 20 mg cp |  | Oui | | | 2,6 |
| LAMICTAL cp dispersible |  | | | | 1,6 |
| LAMISIL 250 mg cp | <u>ND</u> | | | | |
| LARGACTIL 25 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 5,6 |
| LARGACTIL 100 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 5,6 |
| LARIAM 250 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5 |
| LAROXYL 25 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| LAROXYL 50 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 6 |
| LASILIX FAIBLE 20 mg cp |  | Oui | PA photosensible | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| LASILIX 40 mg cp |  | Oui | PA photosensible | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| LASILIX RETARD 60 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | sol. buvable | 2,4,5,6 |
| LASILIX SPECIAL 500 mg cp |  | Oui | PA photosensible | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |














| | | | | | |
|---------------------------|---|-----|--|----------------------|-----------|
| LEDERFOLINE 5 mg cp |  | Oui | à diluer dans l'eau , ne pas mélanger avec d'autres produits | | 2,6 |
| LEDERFOLINE 25 mg cp |  | Oui | à diluer dans l'eau , ne pas mélanger avec d'autres produits | | 2,6 |
| LEDERMYCINE 150 mg cp | NON | | | | 3,6 |
| LEPONEX 25 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,6 |
| LEPONEX 100 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,6 |
| LEPTICUR 10 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5 |
| LEVOTHYROX cp tout dosage | NON | | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| LEXOMIL 6 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| LIORESAL 10 mg cp |  | Oui | | | 2,3,6 |
| LOPRESSOR LP 200 mg cp | NON | | forme retard | | 1,6 |
| LOPRIL 25 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| LOPRIL 50 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| LOXAPAC 50 mg cp | NON | | | sol. buvable | 2,3,6 |
| LOXEN 20 mg cp | NON | | | | 1,6 |
| LOXEN LP 50 mg gélule | NON | | | | 5,6 |
| LUDIOMIL 25 mg cp |  | Oui | | | 2,4,5,6 |
| LUDIOMIL 75 mg cp |  | | | | 2,3,4,6 |
| LUTENYL 5 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| LYRICA tout dosage gélule |  | Oui | | | 6,7 |
| MALOCIDE 50 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| MEDROL 4 mg cp |  | Oui | | préférer AIS soluble | 2,3,4,5,6 |
| MEDROL 16 mg cp |  | Oui | | préférer AIS soluble | 2,3,4,5,6 |
| MEDROL 32 mg cp |  | Oui | | préférer AIS soluble | 2,3,4,5,6 |
| MEDROL 100 mg cp |  | Oui | | préférer AIS soluble | 3,6 |











| | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|--|-----------|
| MEPRONIZINE cp |  | Oui | | | 3 |
| MESTINON 60 mg cp |  | Oui | | | 3,4,5,6 |
| MESTINON RETARD 180 mg cp | NON | | forme retard | | 2,3,4 |
| METHOTREXATE 2,5 mg cp | NON | | | | 3,6 |
| MIANSERINE cp |  | Oui | utiliser rapidement | | 6,7 |
| MINI-SINTROM 1 mg cp |  | Oui | attention marge thérapeutique étroite | | 2,3,4,5,6 |
| MOCLAMINE 150 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| MODIODAL 100 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| MODITEN cp 25 et 100 mg | NON | | PA photosensible | préférer sol. buvable | 3,6 |
| MODOPAR 62,5 mg gélule | NON | | | cp dispersible | 5,6 |
| MODOPAR 125 mg gélule | NON | | | cp dispersible | 5,6 |
| MODOPAR 250 mg gélule | NON | | | cp dispersible | 5,6 |
| MODOPAR LP 125 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | cp dispersible | 2,3,4,5 |
| MODOPAR 125 mg cp disp |  | Oui | | | 3,4,5,6 |
| MODURETIC cp |  | Oui | | | 3,6 |
| MONICOR LP 20 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 2,3,4,6 |
| MONICOR LP 40 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 2,3,4,6 |
| MONICOR LP 60 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 2,3,4,6 |
| MONOTILDIEM LP 200 mg gélule | NON | | | | 3,6 |
| MONOTILDIEM LP 300 mg gélule | NON | | | | 3,6 |
| MOPRAL 10 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules. Risque d'obstruction de la sonde | | 3,5,6 |
| MOPRAL 20 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules. Risque d'obstruction de la sonde | | 2,3,4,5,6 |
| MYAMBUTOL 400 mg cp |  | Oui | | | 2,5,6 |
| MYCOSTATINE 500000 UI cp |  | Oui | | Préférer Mycostatine 100 000 UI/ml susp. buv. | 2,3,4,5,6 |




















| | | | | |
|-------------------------|---|-----|---------------|-----------|
| MYNOCINE 100 mg gélule |  | Oui | | 2,4,5 |
| MYSOLINE 250 mg cp |  | Oui | | 2,4,5,6 |
| NEOMERCAZOLE 5 mg cp |  | Oui | | 2,3,4,5,6 |
| NEOMERCAZOLE 20 mg cp |  | Oui | | 4,5,6 |
| NEORAL 10 mg capsule | <u>NON</u> | | | 5 |
| NEORAL 25 mg capsule | <u>NON</u> | | | 3,5 |
| NEORAL 50 mg capsule | <u>NON</u> | | | 3,5 |
| NEORAL 100 mg capsule | <u>NON</u> | | | 3,5 |
| NEULEPTIL 10 mg gélule | <u>NON</u> | | sol. buvable | 6 |
| NEULEPTIL 25 mg cp | <u>NON</u> | | sol. buvable | 3,6 |
| NEURONTIN 100 mg gélule |  | Oui | | 3,5,6 |
| NEURONTIN 300 mg gélule |  | Oui | | 3,5,6 |
| NEURONTIN 400 mg gélule |  | Oui | | 3,5,6 |
| NEURONTIN 600 mg gélule |  | Oui | | 3,5,6 |
| NICOBION 500 mg cp |  | Oui | | 2,3,4,5,6 |
| NIFLURIL 250 mg gélule | <u>NON</u> | | forme suppo | 2,3,4,5 |
| NIFUROXAZIDE gélule | <u>NON</u> | | | 6 |
| NIMOTOP 30 mg cp |  | Oui | | 2,3,6 |
| NIVAQUINE 100 mg cp | <u>NON</u> | | forme sirop | 2,3,4,5,6 |
| NIZORAL 200 mg cp | <u>NON</u> | | susp. buvable | 2,3,4,5,6 |
| NOCTAMIDE cp |  | | | 7 |
| NOCTRAN 10 mg cp | <u>NON</u> | | | 7 |
| NOOTROPYL 400 mg cp | <u>NON</u> | | sol. buvable | 2,3 |
| NOOTROPYL 800 mg cp | <u>NON</u> | | sol. buvable | 2,3 |













| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----------------------|---------------|-----------|
| NOROXINE 400 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| NORSET 15 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 3,6 |
| NORVIR 100 mg capsule | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 3,5,6 |
| NOVONORM 0,5 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| NOVONORM 1 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| NOVONORM 2 mg cp |  | Oui | | | 6 |
| NOZINAN 25 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| NOZINAN 100 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| OFLOCET 200 mg |  | Oui | instable à la lumière | | 2,3,4,5,6 |
| OMEXEL LP cp | <u>NON</u> | | forme retard | | 1 |
| ONCOTAM 10 mg cp |  | Oui | | | 2,4 |
| ONCOTAM 20 mg cp |  | Oui | | | 2,4 |
| ORACILLINE 1 MUI cp | <u>NON</u> | | | susp. buvable | 2,6 |
| ORAP cp | <u>NON</u> | | | | |
| ORBENINE 500 mg gélule |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| ORELOX 100 mg cp | <u>NON</u> | | | susp. buvable | 2,6 |
| OROKEN 200 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| PALUDRINE 100 mg cp |  | Oui | PA très amer | | 2,3,4,5,6 |
| PARKINANE LP 5 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 1,3 |
| PARLODEL 2,5 mg cp |  | Oui | | | 2,4,5 |
| PARLODEL 5 mg gélule |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| PARLODEL 10 mg gélule |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| PEFLACINE 400 MG CP |  | Oui | PA photosensible | | 2,3,4,5,6 |
| PERMIXON 160 mg gélule |  | Oui | goût amer | | 3,6 |









| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---|---------------|-----------|
| PIPORTIL 10 mg | NON | | | sol. buvable | |
| PIPRAM FORT 400mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| PIRILENE 500 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| PLAQUENIL 200 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| PLAVIX 75 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| PRAXILENE 200 mg cp |  | Oui | irritant pour l'œsophage | | 2,3,4,5,6 |
| PRAXINOR cp | NON | | | | 2,3,4,5,6 |
| PRAZINIL 50 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| PREPULSID 10 mg cp | NON | | | susp. buvable | 2,3,4,5 |
| PRETERAX cp |  | Oui | adm. immédiate + eau | | 7 |
| PREVISCAN 20 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| PRIMPERAN 10 mg cp | NON | | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| PROFENID 50 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu PA photosensible | forme suppo | 5,6 |
| PROFENID 100 mg cp | NON | | | forme suppo | 2,3,4,5,6 |
| PROFENID LP 200 mg cp | NON | | | forme suppo | 2,4 |
| PROFENID LP 200 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules PA photosensible | forme suppo | 5,6 |
| PROGLICEM 25 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 2,4,5,6 |
| PROGLICEM 100 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 2,4,5,6 |
| PROGRAF 0,5 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| PROGRAF 1 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| PROGRAF 5 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| PROPYLTHIOURACILE 50 mg cp |  | Oui | | | 2,3,6 |
| PROZAC 20 mg gélule | NON | | | sol. buvable | 2,4,5,6 |
| PYOSTACINE 250 mg cp |  | Oui | | goût amer | 5,6 |











| | | | | | |
|---------------------------|---|-----|--|-----------------------------------|-----------|
| PYOSTACINE 500 mg cp |  | Oui | | goût amer | 2,3,4,5,6 |
| QUINIMAX 100 mg cp |  | Oui | | | 2,5,4,6 |
| QUININE lafran 250 mg cp |  | Oui | | | 2,3,5 |
| REBETOL 200 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 3,6 |
| RENITEC cp | <u>NON</u> | | PA hydrogroscopique et photosensible | | 7 |
| REQUIP 0,25 mg cp |  | Oui | instable à ph sup à 8 | | 3,5,6 |
| REQUIP 0,50 mg cp |  | Oui | instable à ph sup à 8 | | 5,6 |
| REQUIP 1 mg cp |  | Oui | instable à ph sup à 8 | | 3,5,6 |
| REQUIP 2 mg cp |  | Oui | instable à ph sup à 8 | | 5,6 |
| REQUIP 5 mg cp |  | Oui | instable à ph sup à 8 | | 5,6 |
| RETROVIR 100 mg gélule | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| RETROVIR 250 mg gélule | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 2,3,4,5 |
| RETROVIR 300 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 3,6 |
| RE VIA 50 mg cp |  | Oui | | | 3,5,6 |
| RIFADINE 300 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 3,6 |
| RIMIFON 50 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| RIMIFON 150 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| RISORDAN 20 mg cp |  | Oui | écraser délicatement, PA explosif | | 2,3,4,5 |
| RISPERDAL 1 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable ou cp orodispersible | 5,6 |
| RISPERDAL 2 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable ou cp orodispersible | 3,5,6 |
| RISPERDAL 4 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable ou cp orodispersible | 3,4,5,6 |
| RIVOTRIL 2 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| ROCALTROL 0,25 µg capsule | | Oui | adm. <u>par sonde uniquement</u> après ouverture | | 2,3,4,5,6 |
| ROHYPNOL 1 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5 |

















| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---------------|-----------|
| ROVAMYCINE 3 MUI cp | <u>NON</u> | | | | 2,3,4,6 |
| ROXITHROMYCINE cp | <u>NON</u> | | | | 6 |
| RULID 150 mg cp | <u>NON</u> | | | susp. buvable | 3,6 |
| RYTHMODAN LP 250 mg cp | <u>NON</u> | | | | 2,4,5,6 |
| RYTHMODAN 100 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 2,4,5,6 |
| RYTHMOL 300 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SABRIL 500 mg cp | <u>NON</u> | | | forme sachet | 2,3,4,5 |
| SALAZOPYRINE 500 mg cp | <u>NON</u> | | | | 2,3,4,5 |
| SALBUMOL 2 mg cp | <u>NON</u> | | | forme suppo | 2,3,4,5,6 |
| SANDIMMUN 25 mg capsule | <u>NON</u> | | sol. buvable | | 3,6 |
| SANDIMMUN 50 mg capsule | <u>NON</u> | | sol. buvable | | 3,6 |
| SANDIMMUN 100 mg capsule | <u>NON</u> | | sol. buvable | | 3,6 |
| SANMIGRAN 0,50 mg cp |  | Oui | | | 2,4,5 |
| SECTRAL 200 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3,5,6 |
| SECTRAL 400 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3,5,6 |
| SEGLOR 5 mg gélule |  | Oui | | | 3 |
| SELOKEN LP 200 mg cp | <u>NON</u> | | forme retard | | 1,6 |
| SERC 8 mg cp |  | Oui | | | 2,4,5,6 |
| SERECOR 300 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser les granules | | 2,3,4,6 |
| SERESTA 10 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SERESTA 50 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SEROPLEX 10 mg cp |  | Oui | diluer dans l'eau après écrasement | | 7 |
| SEROPLEX 20 mg cp |  | Oui | | | 7 |
| SEROPRAM 20 mg cp | <u>NON</u> | | | sol. buvable | 3 |

















| | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| SINEMET 100 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SINEMET 250 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SINEMET LP 25/100 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3,5,6 |
| SINEMET LP 50/200 mg cp | <u>NON</u> | | | | 2,3,4,5,6 |
| SINTRON 4 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SKENAN LP 10 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,5,6 |
| SKENAN LP 30 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,5,6 |
| SKENAN LP 60 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,5,6 |
| SKENAN LP 100 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,5,6 |
| SKENAN LP 200 mg gélule |  | Oui | | | 3,5,6 |
| SOLIAN 100 mg cp |  | Oui | | sol. buvable | 3,5,6 |
| SOLIAN 200 mg cp |  | Oui | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| SOLIAN 400 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3,5,6 |
| SOPHIDONE LP 4 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 6 |
| SOPHIDONE LP 8 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 6 |
| SORIATANE 10 mg gélule |  | Oui | | | 2,3,4,5 |
| SORIATANE 25 mg gélule |  | Oui | | | 2,3,4,5 |
| SOTALEX 80 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SOTALEX 160 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SOTALOL cp |  | Oui | | | 6,7 |
| SPASFON Iyoc 80 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SPECIAFOLDINE 5 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SPORANOX 100 mg gélule |  | non | risque de colmatage des sondes | sol. buvable | 3,4,5,6 |
| STABLON 12,5 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| STAGID 700 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| STEDIRIL cp | NON | | | | 3 |
| STILNOX 10 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SUBUTEX 0,4 mg cp <u>sublingual</u> | NON | | | | 6 |
| SUBUTEX 2 mg cp <u>sublingual</u> | NON | | | | 6 |
| SUBUTEX 8 mg cp <u>sublingual</u> | NON | | | | 6 |
| SULFARLEM S 25 25 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| SURGESTONE cp | ND | | | | 7 |
| SUSTIVA 50 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| SUSTIVA 100 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| SUSTIVA 200 mg gélule |  | Oui | | | 6 |
| TAHOR 10 mg cp |  | Oui | | | 3,5,6 |
| TAHOR 40 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| TAMIFLU 75 mg gélule | NON | | | poudre pour suspension buvable | 6 |
| TANGANIL 500 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,6 |
| TARDYFERON 80 mg cp | NON | | | | 2,3,4,6 |
| TARDYFERON B9 mg cp | NON | | | | 2,3,4,6 |
| TAVANIC 500 mg cp |  | Oui | adm. immédiate / PA photosensible | | 7 |
| TEGRETOL 200 mg cp | NON | | | susp. buvable | 2,3,4,5,6 |
| TEGRETOL LP 200 mg cp | NON | | | | 2,4,5,6 |
| TEGRETOL LP 400 mg cp | NON | | | | 2,3,4,5,6 |
| TEMESTA 1 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| TEMESTA 2,5 mg cp |  | Oui | | | 5,6 |
| TEMGESIC 0,2 mg cp <u>sublingual</u> | NON | | voie sublinguale | | 6 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|--------------|--|-----------|
| TEMODAL 5 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 3,6 |
| TEMODAL 20 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 3,6 |
| TEMODAL 100 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 3,6 |
| TEMODAL 250 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 3,6 |
| TENORMINE 50 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| TENORMINE 100 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| TERALITHE 250 mg | <u>NON</u> | | | | 2,3,4,5 |
| TERALITHE LP 400 mg | <u>NON</u> | | | | 2,3,4,5,6 |
| TERCIAN 25 mg cp | <u>NON</u> | | sol. buvable | | 2,3,4,5 |
| TERCIAN 100 mg cp | <u>NON</u> | | sol. buvable | | 2,3,4,5 |
| THICOLCHICOSIDE 4 mg cp |  | Oui | | | 6,7 |
| THIOPHENICOL 250 mg cp |  | Oui | | | 2,4 |
| TIAPRIDAL 100 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| TICLID 250 mg cp |  | Oui | | | 3,5,6 |
| TILDIEM 60 mg cp | <u>NON</u> | | | | 1,6 |
| TOFRANIL cp | <u>ND</u> | | | | 7 |
| TOPALGIC 50 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| TOPALGIC LP 100 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3,6 |
| TOPALGIC LP 150 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3 |
| TOPALGIC LP 200 mg cp | <u>NON</u> | | | | 3 |
| TORENTAL LP 400 mg cp | <u>NON</u> | | | | 2,3,4,5,6 |
| TRANDATE 200 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| TRANXENE 5 mg gélule | <u>NON</u> | | | préférer un équivalent en sol. buvable | 2,3,4,5 |
| TRANXENE 10 mg gélule | <u>NON</u> | | | préférer un équivalent en sol. buvable | 2,3,4,5 |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----|--------------|-----------|
| TRANXENE 50 mg cp | <u>NON</u> | | | 2,3,4,5 |
| TREDEMINE 500 mg p |  | Oui | | 2,3,4,5 |
| TRIFLUCAN 50 mg gélule |  | Oui | | 2,3,4,5,6 |
| TRIFLUCAN 100 mg gélule |  | Oui | | 2,3,4,5,6 |
| TRIFLUCAN 200 mg gélule |  | Oui | | 2,3,4,5,6 |
| TRILEPTAL 300 mg cp | <u>NON</u> | | | 3,6 |
| TRIMEBUTINE 100 mg cp |  | ND | | 7 |
| TRIVASTAL 20 mg cp | <u>NON</u> | | | 3,4,5,6 |
| TRIVASTAL LP 50 mg cp | <u>NON</u> | | | 2,3,4,5,6 |
| TROLOVOL 300 mg cp |  | Oui | | 2,3,4,5,6 |
| UN ALFA 1 µg capsule | <u>NON</u> | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| UN ALFA 0,25 µg capsule | <u>NON</u> | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| URBANYL 10 mg cp | <u>NON</u> | | | 2,3,4,6 |
| UTROGESTAN capsule | <u>NON</u> | | | 6 |
| VALIUM 2 mg cp | <u>NON</u> | | sol. buvable | 6 |
| VALIUM 5 mg cp | <u>NON</u> | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| VALIUM 10 mg cp | <u>NON</u> | | sol. buvable | 2,3,4,5,6 |
| VASTAREL 20 mg |  | Oui | | 3,5,6 |
| VASTAREL LP 35 mg cp | <u>NON</u> | | | 1,6 |
| VASTEN 20 mg cp |  | Oui | | 3,5,6 |
| VASTEN 40 mg cp |  | Oui | | 3,5,6 |
| VECTARION 50 mg cp |  | Oui | | 2,3,4,5,6 |
| VERAPAMIL LP 120 mg cp | <u>NON</u> | | | 1,5,6 |
| VERAPAMIL LP 240 mg cp | <u>NON</u> | | | 1,5,6 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|---------------------------|-----------------------|-----------|
| VIBRAMYCINE N 100 mg cp |  | | | | 2,4,5,6 |
| VIDEX 25 mg cp pr susp buv |  | Oui | | | 2,3,5,6 |
| VIDEX 50 mg cp pr susp buv |  | Oui | | | 2,3,5,6 |
| VIDEX 100 mg cp pr susp buv |  | Oui | | | 2,3,5,6 |
| VIDEX 150 mg cp pr susp buv |  | Oui | | | 2,3,5,6 |
| VIDEX 200 mg cp pr susp buv |  | Oui | | | 3,5,6 |
| VIDEX 125 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,6 |
| VIDEX 200 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,6 |
| VIDEX 250 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,6 |
| VIDEX 400 mg gélule |  | Oui | ne pas écraser le contenu | | 3,6 |
| VIRACEPT 250 mg cp |  | Oui | | préférer forme poudre | 3,6 |
| VIRAMUNE 200 mg cp | <u>NON</u> | | | susp. buvable | 3,5,6 |
| VISCERALGINE 50 mg cp | <u>NON</u> | | | forme suppo | 2,3,4,5 |
| VITAMINE B1 B6 cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| VOLTARENE 25 mg cp | <u>NON</u> | | | forme suppo | 5,6 |
| VOLTARENE 50 mg cp | <u>NON</u> | | | forme suppo | 2,3,4,5,6 |
| VOLTARENE LP 75 mg cp | <u>NON</u> | | forme retard | | 1,5 |
| VOLTARENE LP 100 mg cp | <u>NON</u> | | forme retard | | 1,5 |
| XANAX 0,5 mg cp |  | Oui | | | 2,5,6 |
| XANAX 1 mg cp |  | Oui | | | 2,5,6 |
| XATRAL 2,5 mg |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| XATRAL LP 10 mg | <u>NON</u> | | forme retard | | 1,6 |
| XYZALL 5 mg cp |  | ND | | | 7 |
| ZADITEN 1 mg gélule | <u>NON</u> | | | | 3,5 |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----|------------------------|----------------------------|-----------|
| ZECLAR 250 mg cp |  | Oui | | | 2,3,6 |
| ZECLAR 500 mg cp |  | Oui | | | 3,4,5,6 |
| ZEFFIX 100 mg cp | NON | | | | 3,6 |
| ZERIT 15 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| ZERIT 20 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| ZERIT 30 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| ZERIT 40 mg gélule |  | Oui | | | 3,6 |
| ZESTRIL 5 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| ZESTRIL 20 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| ZOCOR 5 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| ZOCOR 20 mg cp |  | Oui | | | 3,6 |
| ZOLOFT 50 mg gélule | NON | | | | 3,6 |
| ZOPHREN cp | NON | | | forme sirop ou lyophilisat | 3,6 |
| ZOVIRAX 200 mg cp | NON | | | susp. buvable | 6 |
| ZYLORIC 100 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| ZYLORIC 200 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| ZYLORIC 300 mg cp |  | Oui | | | 2,3,4,5,6 |
| ZYPREXA 5 mg cp | NON | | | zyprexa velotab | 3,6 |
| ZYPREXA 7,5 mg cp | NON | | | zyprexa velotab | 3,6 |
| ZYPREXA 10 mg cp | NON | | | zyprexa velotab | 3,6 |
| ZYPREXA vélotab 5 mg |  | Oui | dispenser sans écraser | | 3,6 |
| ZYPREXA vélotab 7,5 mg |  | Oui | dispenser sans écraser | | 3,6 |
| ZYPREXA vélotab 10 mg |  | Oui | dispenser sans écraser | | 3,6 |

Références :

- (1) Monographie du Vidal édition 2008
- (2) Pharmacie Hospitalière Française n° 118, 1996, pp 180-196
- (3) CHU de Nîmes "Liste des médicaments administrables par sonde", 1999 (www.adiph.org)
- (4) ANAES "Soins et surveillance des abords digestifs pour l'alimentation entérale chez l'adulte en hospitalisation et à domicile", 2000, pp 59-65
- (5) Comité Régional du Médicament et des Dispositifs Médicaux de la Région Centre. CRMDM.
Fiche de bon usage "Formes orales sèches et nutrition entérale par sonde naso-gastrique. Janv. 2003.
- (6) Observatoire Régional du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles Poitou-Charentes (ORMEDIMS Poitou-Charentes)
"Bonnes pratiques d'administration des Médicaments par sonde de nutrition ou pour les patients ayant des difficultés à avaler les formes solides". Oct.2007.
- (7) lettre du laboratoire

Auteur : Dr Vailland Valérie, pharmacien

Date : 08 août 2008